

QUY TRÌNH BÓN PHÂN VI LƯỢNG CHO CÂY CÓ MÚI

Bưởi, Cam, Quýt, Chanh cần được bón nhiều phân, cân đối các nguyên tố dinh dưỡng, đủ vi lượng cây mới sinh trưởng khỏe, sung sức, chống chịu tốt với sâu và bệnh hại, bền cây, cho thu hoạch cao và nâng cao chất lượng quả.

* **Kết hợp phân đa lượng với trung vi lượng để nâng cao năng suất và chất lượng Bưởi, Cam, Quýt, Chanh:**

1. **Utah/CHELAX Rice Mix:** Có chứa tới 22% CaO và các trung vi lượng khác ở dạng chelate hữu cơ, giúp cây trồng phát triển mạnh bộ rễ, thân, lá để chuẩn bị cho năng suất và chất lượng nông sản. Ngoài ra còn cải tạo cơ cấu đất tránh ngộ độc, ngăn ngừa các hiện tượng xoắn lá, vàng lá, cháy lá, bạc lá, rụng hoa, rụng lá, còi cọc, chết nhánh-ngọn-cành, biến dạng trái, thối trái, đen trái, dày vỏ trái và các hiện tượng khác, đồng thời làm tăng hiệu lực phân bón đa lượng.

Liều lượng: Bón 3-4 kg/1000m², bón 2-3 lần cùng với những lần bón phân khác.

2. **Greendelta-25** hay **Greendelta-21:** Giúp lá, rễ, nhánh cây phát triển xanh-đẹp, kéo dài tuổi thọ và thời kỳ thu hoạch.

Liều lượng: 20-25g/bình 20L phun từ sau khi thu hoạch 10-15 ngày và lặp lại 1 lần/tháng. Từ khi cây có bông cho tới khi thu hoạch, phun thường xuyên hơn 7-10 ngày/lần

3. **Deltaforlia-K** hay **Delta-K** và **Combi-M** Giúp cây cứng cáp, ra hoa đồng loạt, tập trung, quả to hơn, màu sắc sáng hơn ngọt hơn, nặng hơn và thơm hơn. Thời gian thu hoạch sớm hơn, bảo quản và vận chuyển được lâu hơn.

Phun định kỳ 15-20 ngày/lần: 20g/20L nước (200g/200L nước) thời kỳ cây con và sau thu hoạch.

Phun trước khi ra hoa và sau khi có trái 7-10 ngày/lần: 20g/20L nước cho tới khi thu hoạch.

4. **Deltamicro** hay **Feticombi-5:** nhằm ngăn ngừa các hiện tượng xoắn lá, vàng lá sớm/vi lượng, cháy lá, bạc lá, rụng hoa, thối trái, đen trái, biến dạng trái, dày vỏ trái, còi cọc, ngộ độc, chết nhánh-ngọn-cành và các hiện tượng khác.

Liều lượng: Pha 2-2,5g/bình 20L (20-25g/200L nước). Đối với những cây đã cho thu hoạch phun ngay sau khi thu hoạch 5-10 ngày và lặp lại 1 tháng 1 lần cho tới khi thu hoạch.

5. **Gronta** hay **CHELAX Calcium Boron:** Sử dụng trước-trong và sau khi ra hoa giúp cây phân hóa mầm hoa, tăng thụ phấn, chống rụng/đen hoa và trái non, cây cứng và khỏe.

Liều lượng: **Gronta:** pha 2-3g/bình 20L phun xịt 3-7 ngày/lần

CHELAX Calcium Boron: Gói 5ml/bình 20L, chai 100ml/ cho 3-4 phuy 200L nước.

6. **Canximax** kết hợp với **CHELAX Sugar Express:** áp dụng từ khi ra hoa cho tới khi thu hoạch. Phun 15-20 ngày/lần, có thể phun thường xuyên hơn khi đã có trái làm cho trái lớn nhanh hơn, chất lượng tốt hơn, kéo dài được thời gian thu hoạch trong 1 vụ.

Liều lượng: **Canximax:** pha 15-20ml/bình 20L (1-1,5L/ha)

CHELAX Sugar Express: pha 5ml/bình 20L, chai 100ml/cho 3-4 phuy 200L nước.