

**Thông tin *Greendelta* về thị trường Vật tư nông nghiệp (VTNN)**

**Số quý 2 năm 2011**

*(Tiếp theo số trước)*

**CHĂM SÓC CÂY TRỒNG CHUẨN MỰC NHẤT TỪ PHÂN BÓN (Phần 2)**

Gần đây giá cả các Nông sản tăng lên rất cao không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới. Đã hình thành nên mức bằng giá mới cho Nông sản trên thị trường, do quan điểm và nhận thức đã được thay đổi. Các mặt hàng gia dụng như xe cộ, nhà cửa, máy móc ít hay nhiều ai cũng có và chu kỳ thay đổi ít ra hàng năm hay nhiều năm hơn nữa. Nhưng Nông sản nói chung hay thực phẩm nói riêng thì mọi người phải sử dụng hàng ngày và không thể thiếu được. Mặt khác do kinh tế phát triển cao nên nhu cầu về Nông sản không chỉ no/đủ mà còn phải ngon/sạch và phải an toàn-do nhận thức rõ ăn ngon, ăn sạch được đặt lên hàng đầu trên cả nhu cầu về các mặt hàng gia dụng do vậy Nông sản/lương thực/thực phẩm đã có mặt bằng giá mới và ngày một cao hơn.

- Do vậy đây là cơ hội tốt cho người trực tiếp sản xuất Nông nghiệp nói chung và nghề Trồng trọt nói riêng-trồng trọt ra những cây trái, rau-củ, lương thực... để tăng thu nhập ở mức cao nhất cho người trồng trọt thì khâu tăng năng suất, chất lượng Nông sản thông qua **Phân bón** được đặt lên hàng đầu trong các khâu chăm sóc cây trồng khác.

- Vậy sử dụng Phân bón như thế nào để người trồng trọt/nông dân có thu nhập cao nhất? Như đã biết trong trồng trọt các loại cây trồng được chia ra 2 nhóm chính.

\* **Nhóm cây trồng ăn lá** (Rau ăn lá các loại, thuốc lá, trà...)

\* **Nhóm cây trồng ăn trái/quả, củ và hạt** (Lúa, cây công nghiệp, cây ăn trái, lấy củ..)

- Trong phạm vi của bài viết này chúng ta chỉ đề cập tới nhóm cây trồng **ĂN LÁ và THỜI KỲ CÂY NON CỦA CÂY TRÁI CỦ QUẢ VÀ HẠT.**

**A: Nhóm cây trồng ăn lá:** (Rau thập tự các loại, rau thơm các loại, các loại cỏ, thuốc lá, trà/chè, rau muống, rau cần, bầu/bí lấy ngọn, xà lách xoong, cải thảo, xu hào...)

Các cây trồng trong nhóm này có vòng đời ngắn một tới vài tháng. Do vậy chăm sóc các cây trồng này thông qua phân bón rất quan trọng từ việc **chọn loại phân bón hiệu quả nhất tới thời gian bón và số lần bón.** Mặt khác với loại cây trồng này yêu cầu loại phân bón và loại dinh dưỡng khác xa so với các loại cây trồng khác do vậy cần chú ý các thời kỳ bón/phun/xịt phân bón như sau:

- **Phân qua góc/rễ:** Vẫn sử dụng như bình thường, chỉ bổ sung Vi lượng Chelate **Utah/CHELAX ½** với liều lượng 3-5kg/1000m<sup>2</sup> bón làm 2 lần trước khi gieo hạt/trồng và sau lần 1 khoảng 1-1,5 tháng.

- **Thời kỳ đầu (Sinh trưởng dinh dưỡng):** Khi cây trồng được 5-7 lá cho đến khi trước thu hoạch 10-15 ngày: Cần phun/xịt thường xuyên **Greendelta-25** hay **Nitroforlia** hoặc **Greendelta-12** hay **Greendelta-L** với **CHELAX Lay-O** định kỳ 5-7 ngày/lần. Ngoài ra để tránh các hiện tượng bất thường/bất lợi về sau phun/xịt 1-2 lần **Deltamicro** hay **Feticombi-5** hoặc **CHELAX Combi** và 1-2 lần **Caximax** hay **CHELAX Calcium Boron**

- **Thời kỳ trước khi thu hoạch 10-15 ngày:** Để tăng chất lượng, phần cấp và lưu trữ, vận chuyển được lâu các loại rau ăn lá trên. Phun/xịt định kỳ 5-7 ngày/lần bằng **Deltaforlia-K**, **Combi-M** hay **Greendelta-19** với **CHELAX Sugar Express** và 1-2 lần **Delta-K**. Không thể thiếu 1-2 lần với **Canximax** và **Deltamicro** hay **Feticombi-5**

**B, Các cây trồng khác ở thời kỳ cây non hay sau khi thu hoạch 1 vụ mùa:** (Cà phê, tiêu, điều, ca cao, xoài, ổi, thanh long, cam/bưởi/quýt/chanh, vú sữa, vải/nhãn, măng cầu/na, mận/doi, sầu riêng, chôm chôm...)

\* **Đối với phân bón gốc/rễ:** Bón bình thường như lâu nay, bón thêm 3-5kg **Utah/CHELAX 10/2** hay **Utah/CHELAX Rice Mix/** 1000m<sup>2</sup> với định kỳ 3-4 tháng bón một lần.

\* **Đối với phân bón qua lá:** Phun/xịt hay tưới:

- **Với thời kỳ cây non:** Phun/xịt thường xuyên **Greendelta-25** hay **Nitroforlia** hoặc **Greendelta-12** hay **Greendelta-L** với **CHELAX Lay-O** định kỳ 20-30 ngày/lần. Ngoài ra để tránh các hiện tượng bất thường/bất lợi về sau phun/xịt tháng/lần **Deltamicro** hay **Feticombi-5** hoặc **CHELAX Combi**

- **Với thời kỳ cây trồng sau thu hoạch:** Đây là thời kỳ rất quan trọng đối với cây lấy củ, trái/quả và hạt thuộc cây trồng lâu năm vì sau mỗi lần thu hoạch cây trồng mất sức rất nghiêm trọng gần như cạn kiệt. Vì vậy sau khi thu hoạch một vụ cần nhanh chóng cung cấp lại dinh dưỡng gấp để cây trồng phục hồi nhanh và là tiền đề để năng suất và chất lượng vụ tiếp theo đạt mức cao nhất. Phun/xịt thường xuyên và liều lượng cao hơn với **Greendelta-25** hay **Nitroforlia** hoặc **Greendelta-12** hay **Greendelta-L** với **CHELAX Lay-O** định kỳ 10-15 ngày/lần. Ngoài ra để tránh các hiện tượng bất thường/bất lợi về sau phun/xịt 1-2 lần **Deltamicro** hay **Feticombi-5** hoặc **CHELAX Combi**

Làm được và làm đúng như đề xuất nêu trên thì thu nhập thực tế của người sản xuất, người trồng trọt sẽ đạt được **hiệu quả kinh tế cao nhất** do thu nhập tăng rất cao trên cùng một đơn vị diện tích so với sản xuất/trồng trọt như lâu nay mà không phun/xịt như đề xuất nêu trên

**Chúc bà con nông dân một vụ mùa mới năng suất và chất lượng cao nhất bán Nông sản đạt mức cao nhất trong vùng của cùng một loại cây trồng.**

Xem lại các số trước tại: [www.greendelta.com.vn](http://www.greendelta.com.vn)

**Greendelta** *chất lượng tốt đỉnh*